比較的少く，山地のものに比して，茎が太く硬いものがしばしばある。

49) *Suillus granulatus* (Fr.) O. Kuntze　チチアワタケ

Hab. In pine woods, Aoyama, Niigata, June 28, 1954.

6 月～10 月。比較的豊産する。

50) *Suillus luteus* (Fr.) S. F. Gray　ヌメリイグチ

Hab. In pine woods, Kōdo, Niigata, Oct. 11, 1954.

豊産する。当地方ではババゴケと称し，劣視等するが，時に市場に出る。

51) *Phylloporus rhodoxanthus* (Schw.) Bres.　キヒダタケ

Hab. In pine woods, Matsunami-chō, Niigata, July 10, 1954.

6 月～10 月。砂丘地帯ではやや稀である。

52) *Boletus pulverulentus* Opat.　イロガワリ

Boletus badiu Kawamura (Non Fries).

Hab. On sandy soil under *Robinia pseudo-acacia*, Matsunami-chō, Niigata, July 10, 1954.

砂丘地ではとくにニセアカシヤの林に多いようである。従来イロガワリには *Boletus badius* Fr. があてられてきたが，最近今関氏〔Nagaoa, **2**: 37 (1952)〕は *Xerocomus pulverulentus* (Opat.) Gilb. なる学名をもちいられた。真正の *Boletus badius* Fr. 〔=*Xerocomus badius* (Fr.) Kühner〕は肉の青変が不顕著で，傘の色は黄褐色，肉桂色，クリ色又は赤褐色を呈しており，筆者の一人本郷はこれを 1954 年 8 月 10 日，大津市三井寺山内で採つている。*Boletus badius* Fr. に対しては新和名，**ニセイロガワリ**を与える。

53) *Boletus rubellus* Krombh.　コウジタケ

Hab. On sandy soil in pine woods (mixed with *Robinia*), Matsunami-chō, Niigata, July 10, 1954.

54) *Gyroporus castaneus* (Fr.) Quél.　クリイロイグチ

Hab. In pine woods, Matsumami-chō, Niigata, July 10, 1954.

Spores measure 8–10.5×4.5–5.5μ.

○ミカエリソウの白花品　(矢頭献一) Ken-Ichi YATOH: *Comanthosphace stellipila* f. *albiflora* forma nov.

近畿の山地に多いミカエリソウは普通花冠はバラ紅色，雄芯，花柱もともに濃紅紫色であるが，1955 年 10 月 8 日，伊勢国，一志郡，美杉村にある三重大学農学部附属平倉演習林で花冠，雄芯，花柱等花部の純白の品を同演習林勤務の久保文良君大採集した，個体数はあまり多く見られないが一個所に集つて生育している。シロバナミカエリソウの和名をつけて記録しておきたい。

Comanthosphace stellipila (Miq.) Moore. f. **albiflora** Yatoh form. nov.—Flores albi. Nom. Jap. Shirohana-Mikaerisō.—Hab. Hondo: in monte Hirakura, Prov. Ise (Fumiyoshi Kubo, 1955–typus in Herb. Univ. Mie).　(三重県立大学農学部)